

Über Perforation zwischen Oesophagus und Trachea.

In a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 12. Januar 1937.

von

H a n s B r a u n

prakt. Arzt aus Friesheim (Rheinland)

Bonn 1937

Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Graff.

Korreferent: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz.



Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bei den Erkrankungen der Speise- bzw. der Luftröhre kommt es gelegentlich zum Durchbruch bzw. zur Kommunikation und Fistelbildung in die beiden benachbarten Hohlorgane hinein. Das hängt mit der anatomischen Lage der beiden betreffenden Organe zusammen. Daher ist es wichtig, einmal auf die Anatomie dann aber auch auf die Topographie sowie die Untersuchungsmethoden der Speise- und Luftröhrenperforation näher einzugehen.

Die Speiseröhre beginnt am unteren Rande des Ringknorpels. Man unterscheidet einen Halsteil, der bis zur Kehlgube geht und 4 bis 7 cm lang ist, einen Brustteil, von der Kehlgube bis zum Zwerchfell führend, von ca 14—19 cm Länge und einen Bauchteil, der nur 2—4 cm lang ist. Von Wichtigkeit für den Sitz der Erkrankungen bzw. der Perforation sind die drei engen Stellen in der Speiseröhre, die sogenannten „physiologischen Engen v. Hackers.“ Die obere sitzt am Beginn des Oesophagus, die mittlere entspricht der Umgebung der Gabelung der Luftröhre und die untere liegt in der Gegend des Hiatus oesophageus. „Von der Durchschnittslänge des Oesophagus beim erwachsenen Mann (25 cm) ausgehend, kann man im allgemeinen sagen: Der Oesophagusanfang ist beiläufig ebenso weit von der Zahnreihe entfernt, wie die Kardia von der Bifurkation, ungefähr 15 cm, während die Distanz vom Ringknorpel zur Trachealteilung etwa 10 cm beträgt.“ Im Halsteil besteht eine geringe Abweichung der Speiseröhre von der Mittellinie nach links, später wird sie durch den Aortenbogen nach rechts verdrängt. In der Nähe des achten Brustwirbels legt sie sich vor die Hauptschlagader und weicht nach links ab. Im Zwerchfell ist sie 2—3 cm von der Mittellinie entfernt. Die Luftröhre ist ein ca 10—12 cm langes Rohr und läuft in der Mittellinie des Halses vorn vor der Speiseröhre nach abwärts. Die in ihrer Wandung eingelassenen Knorpelstücke geben ihr eine gewisse Festigkeit und schützen sie vor Zusammenpressungen und äußerem Stoß.

Ist es zum Durchbruch von der vorderen Oesophagus- in die hintere Trachealwand gekommen, so hat man verschiedene diagnostische Untersuchungsmethoden, auf die kurz eingegangen werden soll. Wie bei allen Krankheiten, so steht auch hier die Erhebung einer genauen Anamnese im Vordergrund. Vielfach werden die vom Kranken angegebenen Beschwerden, insbesondere der Hustenreiz, den die eindringenden Speiseteile bedingen, auf einfaches Verschlucken zurückgeführt; daher muß man bei solchen Angaben bisweilen an eine Perforation denken. Nach der Methode von Gerhard kommt man der Diagnose näher. Sie beruht darauf, daß ein mit Oesophagotrachealfistel Behafteter imstande ist, durch die eingeführte Schlundsonde, solange deren Ende oberhalb der Fistel liegt, einen Luftstrom zu schicken, während der Gesunde nur die geringe in der Speiseröhre enthaltene Luftmenge herauspressen kann. Taucht man das äußere Ende der Schlundsonde unter Wasser, so entweichen Luftblasen. Neben der Sondenuntersuchung kann man die Oesophago- bzw. Tracheoskopie anwenden, mit der man nach vorhergehender Anästhesie Größe und Sitz der Perforation feststellen kann. Ridder hat das Trinkenlassen gefärbter Flüssigkeiten empfohlen, die in dem Ausgehusteten leicht nachweisbar sind. Diese Methode verrät jedoch nichts über Lokalisation und Größe der Perforationsstelle. Um die Untersuchungsmethoden zu vervollständigen, ist die Röntgenuntersuchung noch anzugeben. Schwarz beobachtete 1909 als erster den Übertritt von Bariumbrei aus der Speiseröhre in den Bronchialbaum. Heute ist die Untersuchung vor dem Röntgenschirm neben der Oesophagoskopie am gebräuchlichsten, jedoch ist auch hier nach den bisherigen Angaben der Literatur vor wahllosem Breischlucken wegen der dadurch bedingten Komplikationen — insbesondere der Schluckpneumonie und Lungengangrän — zu warnen. Man ist bei der Röntgendurchleuchtung bei genauer Inspektion vielfach nach einem Schluck Bariumbrei in der Lage, das Krankheitsbild zwischen Oesophagus und Trachea zu erkennen.

Am eingehendsten behandelte Sirot 1899 die Perforation nicht nur zwischen Oesophagus und Trachea, sondern überhaupt zwischen Speiseröhre und sämtlichen Luftwegen. Er stellte alle bis

dahin auf diesem Gebiete veröffentlichten Arbeiten zusammen und behandelte ca. 143 Fälle. Hiervon bestand 75mal eine Kommunikation zwischen Oesophagus und Trachea.

Bei der Perforation, von der im folgenden die Rede sein soll, ist eine solche zu unterscheiden, die primär von der Speiseröhre und solche, die primär von der Luftröhre in die beiden Organe eindringt. Wenn auch das Krankheitsbild einer Oesophagotrachealperforation im Vergleich zu den übrigen Erkrankungen der Speise- und Luftröhre relativ selten ist, so nimmt doch die Perforation von der Speiseröhre nach der Luftröhre die Hauptrolle ein, und es sollen im folgenden obige Krankheitsbilder zunächst beschrieben werden. Erst später werde ich dann auf die umgekehrte Perforation näher eingehen. Um das Krankheitsbild der Perforation eingehend zu würdigen, muß es auf das genaueste skizziert werden. Zunächst wäre es falsch, bei jeder Kontinuitätstrennung der beiden Organe gleich an eine Perforation zu denken. Bei einer Spontanzerreißung bzw. einer traumatischen Trennung, handelt es sich vielfach um eine Ruptur der Speise- bzw. Luftröhre, wie sie gelegentlich bei Trinkern vorkommt. Die Spontanruptur ist jedoch auch äußerst selten. Z e n k e r nimmt an, daß der Oesophagusruptur eine Oesophagomalazië vorausgehen müsse. Vielfach kommt es unter gewissen Bedingungen einer äußeren Gewalteinwirkung zur Zerreißung bzw. Ruptur der Speise- und Luftröhre, die plötzlich bei bis dahin anscheinend völligem Wohlbefinden auftritt. Im Gegensatz zu der Ruptur kommt es bei einer Erkrankung der Oesophagus- bzw. Trachealwand zu einer Perforation, die fast stets langsam und meist ohne äußere Gewalteinwirkung auftritt. Da der Durchbruch sich langsam vorbereitet, sind meist schon vorher Verwachsungen mit der Umgebung vorhanden. Daher fehlen die stürmischen Erscheinungen der Ruptur, sowie das beim akuten Durchbruch vorhandene Hautemphysem. Die Folgeerscheinungen des Durchbruches bilden sich erst allmählich aus. Bei entzündlicher Perforation kann sich günstigenfalls die Vernarbungsstelle schließen und Heilung erfolgen. In den meisten Fällen geht jedoch der entzündliche Prozeß auf die Umgebung bzw. die Trachealwand über. Nach R o h d e sind von den

Erkrankungen der Oesophaguswand entzündliche und geschwürige Prozesse nach Verletzungen, ferner Verätzungen und ihre Folgen, akute und spezifische Infektionen, Lues, Tuberkulose sowie das Karzinom zu erwähnen. Der Durchbruch von diesen Erkrankungen erfolgt in das den Oesophagus umgebende Gewebe, insbesondere die Trachea. Von hier aus geht die eitrige Infektion (z. B. eitrige Bronchitis, Pneumonie und Lungengangrän) nach Durchbruch des in der Nähe der Gabelung sitzenden Oesophaguskarzinoms in den Bronchialbaum. Von Interesse sind ferner entzündliche Prozesse, die von den Lymphknoten in der Umgebung des Oesophagus, insbesondere von denen der Gabelung ausgehen. Hier sind vielfach abnorme Wandverhältnisse am Oesophagus vorhanden, zumeist Divertikel mit dünner Wand. Die erkrankten Drüsenpakete, die zur Bildung der Traktionsdivertikel führen, brechen zumeist an der dünnsten Stelle der Divertikelwand durch, bisweilen auch in die Trachea. Solche Fälle sind von Sternberg bei anthrakotischen und tuberkulösen Bronchial- und Mediastinaldrüsen beschrieben worden. Ebenfalls wurde der Durchbruch krebsiger Lymphknoten in diese Organe beobachtet. Vielfach hat die Perforation Phlegmone des perioesophagealen Gewebes und Mediastinitis zur Folge. Die Diagnose einer Perforation ist bei Kenntnis der Grundkrankheit nicht allzu schwer. Oesophagoskopie und Röntgenuntersuchung können dann diagnostischen Aufschluß geben. Die Kontrastfüllung gelangt in solchen Fällen durch die Perforation in die Trachea und den Bronchialbaum. Wegen der schweren Gefahr einer Lungengangrän darf keinesfalls aus solchen Zufallsbefunden eine diagnostische Methode angewandt werden.

Nach Marschik gehen die Perforationen zwischen Speise- und Luftröhre in der Mehrzahl von Oesophagusfremdkörpern aus. Die Perforation tritt vielfach erst nach Entfernung des Fremdkörpers in Erscheinung (Woods). Nach Eulenburg wird die Durchlöcherung häufiger bei Männern als bei Frauen, und mehr im höheren als im jugendlichen Alter angetroffen. Ihr Lieblingssitz ist der der Bifurkation der Trachea benachbarte Teil. Im folgenden sollen nun die durch Fremdkörper bedingten Perforationen kurz ge-

schildert werden, die mir durch Literatur zugänglich waren. Aus dem Jahre 1848 wird über ein Kind berichtet, das während des Spielens sein Spielzeug verschluckte. Der Fremdkörper blieb fünf Monate lang liegen. Während dieser Zeit konnte das Kind — wenn auch schwer — jedoch noch ernährt werden. Die Sektion ergab in 5 cm Tiefe einen im Oesophagus eingeeilten Fremdkörper, der die Trachea verletzt hatte. 1892 berichtet G e r s t e r von einem Kinde, das er infolge hochgradiger Atemnot tracheotomierte und das kurz darauf starb. Die Autopsie ergab einen Knopf in der Mittellinie der vorderen Oesophaguswand, der eine Perforation zwischen Oesophagus und Trachea verursacht hatte. G a n g o l p h e berichtet aus dem Jahre 1898 von einem Kranken, der nachts im Schlafe eine Zahnreihe verschluckt hatte, die drei Monate lang in der Speiseröhre eingekellt war. Der Kranke hatte besonders beim Schlucken heftige Schmerzen und expektorierte eitrigen Schleim. Der Fremdkörper hatte den Oesophagus 28 cm von der Zahnreihe perforiert und mit der Trachea eine Kommunikation geschaffen. Es gelang G a n g o l p h e mittels der Oesophagotomia externa die Zahnreihe zu entfernen. Im Jahre 1902 veröffentlichte C h a v i e r einen Fall, bei dem der Kranke eine zwei Incisiven ersetzende Zahnreihe verschluckt hatte. Der Fremdkörper war in Höhe der Incisura sterni in der Speiseröhre fixiert. C h a v i e r entfernte mittels Oesophagotomia externa die Zahnreihe. Während der Operation vernahm er ein pfeifendes Geräusch von Luft aus der Trachea. Der Kranke wurde geheilt. 1902 behandelte W e i s s einen Kranken, der während des Essens einen Knochen verschluckt hatte. Es gelang nicht, denselben mit der Graeffschen Knochenzange zu entfernen. Bei der Oesophagotomia externa wurde ein flacher Knochen von 3 mal 4 cm entfernt, der die Trachea perforiert hatte. Der Kranke verstarb an Myocarditis. 1904 berichtete G u a t t a n i von einem Betrunkenen, der eine ihm zugeworfene Kastanie mit dem Munde auffing, der sich jedoch nicht operieren lassen wollte und nach 19 Tagen starb. Die Kastanie lag in mittlerer Höhe des Oesophagus und hatte die Trachea in linsengroßer Ausdehnung perforiert. S c h o u s b o e veröffentlichte 1913 einen für uns ebenfalls wichtigen Fall, wo wieder-

um ein Gebißteil eine Oesophagotrachealperforation auslöste bei der die Kranke nicht erfuhr, daß sie einen Gebißteil verschluckt hatte. Hier gab die Oesophagoskopie richtigen Aufschluß über das Krankheitsbild.

Wegen seiner Seltenheit soll hier der im Jahre 1896 von G a r e l beobachtete Fall eines perioesophagealen Abzesses angeführt werden, der durch puerperale, septische Infektion entstand und zur Heilung kam. Es handelte sich um eine 25jährige Frau, die seit vier Jahren verheiratet war und einmal abortiert hatte. Die Kranke gab an, sie habe im zweiten Monat abortiert und acht Tage später auf der rechten Halsseite eine faustgroße Geschwulst beobachtet. Zwei Tage später spuckte sie nachts große Mengen gelben Eiters aus. G a r e l bekam die Kranke sechs Wochen später in Behandlung mit geringer Schwellung am Hals. Nach Wassertrinken erfolgte gleichzeitig Erbrechen. Die Tracheoskopie ergab in Höhe der Bifurkation eine gelblich verfärbte, von rotem Saum umgebene Kommunikation zum Oesophagus hin, die von selbst heilte.

Die Oesophagitis toxica tritt hauptsächlich nach Verätzungen auf. In unserer Zeit werden bisweilen Verätzungen mit Lyfol beobachtet, die eine Perforation zur Folge haben können. Ziegler und P i c k e r t haben je eine durch Verätzung zustande gekommene Perforation zwischen Speise- und Luftröhre beobachtet. Auf den P i c k e r t'schen Fall soll näher eingegangen werden. P i c k e r t stellte am 23. April 1920 in der Hufeland'schen Gesellschaft eine Speiseröhrenverätzung vor, die eine Perforation in die Trachea ausgelöst hatte. Während drei Jahren war keine Bronchopneumonie oder sonstige Lungenkomplikation aufgetreten, weshalb der Fall erwähnenswert ist.

Eine besondere Stellung in der Oesophago-Trachealperforation nimmt das Traktionsdivertikel ein, dessen Wand durch stagnierende Speisereste oder steckenbleibende Fremdkörper gereizt und zerstört wird. Es entsteht vielfach durch Verwachsung der Speiseröhre mit verkästen, bzw. schrumpfenden Lymphdrüsen an der Trachealteilung. G a r n i c h t selten werden ätiologisch dunkle Prozesse im Thoraxraum, insbesondere Lungengangrän, bei der Autopsie durch

den Nachweis eines perforierten Traktionsdivertikels in die Trachea aufgeklärt. Trotz ihres latenten Verlaufes sind dieselben für das Leben eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Möglicherweise perforieren sie vom Lumen des Oesophagus durch Fremdkörperentzündungen oder seltener von der Umgebung der Speiseröhre als Folge von Vereiterungen in den benachbarten Drüsen. Gewöhnlich aber erfolgt der Durchbruch des Eiters in die Trachea bzw. in die Bronchien. Das infektiöse Material kann aspiriert werden, und so entwickelt sich vielfach die Lungengangrän mit nachfolgendem Exitus.

Königstein veröffentlichte im Jahre 1913 einen wegen seines eigenartigen Verlaufes interessanten Fall. Es handelte sich um einen verschluckten Fremdkörper, der eine Oesophagotrachealfistel, Rekurrenslähmung und durch Ausbuchtung der Oesophaguswand ein Traktionsdivertikel ausgelöst hatte. Der Patient klagte seit ca. drei Wochen über Heiserkeit. Das rechte Stimmband bewegte sich frei, das linke dagegen stand in „Kadaverstellung“. Im Bereiche des Nervus laryngeus superior war eine bedeutende Anästhesie festzustellen. Die Tracheoskopie ergab in Höhe der Bifurkation einen ca. wallnußgroßen Tumor, der anscheinend von der hinteren Trachealwand herrührte und beim Berühren mit der Sonde in derselben verschwand. Die Oesophagoskopie ergab einen fest eingekleiten, die Oesophaguswand ausbuchtenden Fremdkörper in Tiefe von ca. 25 cm, der mit seinem oberen Rande frei in das Lumen hervorragte und nach Entfernung eine Zahnprothese ergab. Hawes fand 1920 eine tuberkulöse, schrumpfende Drüse als Ursache eines Traktionsdivertikels, das in die Trachea hinein perforiert war. György veröffentlichte 1932 einen sehr interessanten Fall, bei dem ein 24jähriger Mann, der an Lymphogranulomatose litt, durch Schrumpfung einer lymphogranulomatösen Drüse ein Traktionsdivertikel des Oesophagus bekam, das sekundär in die Trachea perforierte. Bayer beschrieb 1934 das Krankheitsbild eines perforierten Oesophagusdivertikels in die Trachea. Der Kranke hustete nach der Röntgendurchleuchtung noch längere Zeit die Kontrastmasse aus. Um die Ernährung zu sichern, wurde eine Witzelfistel angelegt; jedoch starb der Kranke am siebten Tage an Bronchopneumonie. Da die Autopsie

verweigert wurde, konnte die Ätiologie des Divertikels nicht geklärt werden.

Der Speiseröhrenkrebs soll in der Entstehungsurfläche der Oesophagusperforation zur Trachea nach der zuvor angegebenen Gruppe der Fremdkörper und ihrer Unterabteilungen an zweiter Stelle besprochen werden. Dieser Krankheitsprozeß in der Speiseröhre tritt sehr häufig auf. Nach *Heinemann* steht das Oesophaguscarcinom an fünfter Stelle unter allen Carcinomen mit 5% aller Krebskranken. In der Mehrzahl werden Männer betroffen (ca. 82%), insbesondere solche, die das 50. Lebensjahr überschritten haben (65%). Das legt die Frage nahe, ob in der Entstehungsurfläche eine äußere Schädigung angenommen werden soll, der sich Männer häufiger aussetzen als Frauen. Man könnte an Alkohol- und Nikotinabusus denken. Bezüglich der Lokalisation gibt es verschiedene Auffassungen, die auch für die Perforation von Bedeutung sind und erörtert werden sollen. *Mackenzie* und *Guisez* fanden als einzige ein Überwiegen des oberen Abschnittes, v. *Hacker* dagegen die Höhe der Bifurkation, wohl die meisten das untere Speiseröhrendrittel als Hauptsitz des Krebses. *Sauerbruch* fand in 189 Sektionsfällen von Oesophaguscarcinom im Halsteil 26 (13,7%), von der Brustapertur bis zur Gabelung 14 (7,4%), von der Bifurkation bis zum Hilus 29 (15,3%), vom Hilus bis zur Cardia 117 (61,9%). Das penetrierende Wachstum der Oesophaguscarcinome bewirkt Wanddurchbruch in das umgebende krebssige und verhärtete Bindegewebe oder in die schon vorher infiltrierte Trachealwand. Dies hat eine Verschiebung bzw. Dislokation der Trachea zur Folge. Durch das Weiterfortschreiten dieser Neubildung kommt es zur Kommunikation mit der Speiseröhre, namentlich an der Bifurkationsstelle. Dabei kann die krebssige Infiltration selbst auf die Trachealwand übergreifen, oder es kommt der geschwürige Prozeß nach Durchbruch der krebssigen Schicht zur einfachen Ulzeration und bewirkt Perforation der Trachealwand. Nach *Zenker* und *Ziessens* kam es in 120 Fällen der Oesophagusperforation 70mal zu einer Perforation in die Luftwege und zwar 21mal in die Trachea, 26mal in den rechten oder linken Stammbronchus und 23mal in die

Lungen und zwar 17mal in die rechte und nur 6mal in die linke Lunge.

Hartung berichtete im Jahre 1838 im Hufeland'schen Journal von einer krebshaften Durchlöcherung der Speise- und Luftröhre des Dr. K r i m e r. Nach Sondierung der Speiseröhre wurden alle Speisen, die der Kranke zu schlucken versuchte, unter den heftigsten Schmerzen ausgehustet, so daß aus diesem Symptom heraus an eine Kommunikation zwischen Speise- und Luftröhre gedacht werden mußte, was für die Zukunft jegliches Sondieren der Speiseröhre überflüssig machte. Zuletzt bekam der Kranke heftige Schmerzen im unteren Brustteil und mußte, da der Husten schon nach einem Nahrungsschluck Erstickungsgefahr annahm, durch Klystier ernährt werden. Am 22. 11. erfolgte Exitus letalis. Die Sektion ergab in Höhe der Bifurkation einen Oesophaguskrebs in Größe eines Enteneies, der sich nach der Trachea hin kegelförmig aufspitzte und von der Speise- nach der Luftröhre eine vierfache Perforation gesetzt hatte. Einen anderen interessanten Fall veröffentlichte L i p p i c h im Jahre 1841. Im Vordergrund dieser Erkrankung standen die Schlingbeschwerden, die dauernd zunahmen. Der Kranke versicherte in vollkommener Ruhe, in der Speiseröhre das Gefühl eines „herabhängenden Körpers“ zu haben. Nach einigen Monaten trat plötzlich Erbrechen von einigen Unzen schwarzen Blutes ein. In dem klumpig gewordenen Blut glaubte Lippich einen polypösen Auswuchs entdeckt zu haben. Dieses Erbrechen wiederholte sich noch einige Male, wobei zuletzt hellrotes Blut beobachtet wurde, worauf dann der Patient verstarb. Die Autopsie der Speiseröhre ergab eine größere geschwürige Fläche, die rundlich perforiert war und in die Luftröhre kommunizierte. V i g l a veröffentlichte im Jahre 1855 nachfolgenden Fall: Ein 49jähriger Mann, der einem Phthisiker im letzten Stadium ähnlich sah, hatte mit 24 Jahren an einer Syphilis gelitten. Seit Anfang 1854 klagte er über Schlingbeschwerden und Husten und entleerte täglich 4—5 Spucknapfe Eiter. Der Patient wurde zuletzt durch Klystier ernährt. Der Tod trat unter den Erscheinungen größerer Schwäche ein. Die Sektion ergab eine Adhäsion der Speiseröhre in Höhe des dritten Rückenwirbels. In der Um-

gebung der Adhäsionsstelle fand man in einem Umfang von 7 cm eine krebssige Infiltration, die in der Speiseröhre sechs Perforationen zeigte, von denen zwei mit der Luftröhre kommunizierten. D o l - b e a u berichtete im Jahre 1866 von einem 59jährigen Mann, der an den Erscheinungen einer krebssigen Oesophagusstriktur litt und nach einem Jahr starb. Die Sektion ergab eine krebssige Ulzeration des oberen Teiles der Speiseröhre, sowie eine Kommunikation infolge Perforation der Speiseröhre mit der Trachea in Bifurkationshöhe. F a r l a n d berichtet im Februar 1899 von einem Speiseröhrenkrebs mit Durchbruch in die Luftröhre. Der Krebs war an der Durchbruchstelle zerfallen, so daß das Eindringen des zerfallenen Krebsgewebes in die Lungen Lungengangrän zur Folge hatte. Die unmittelbare Todesursache war eine starke Blutung aus der Perforationsstelle.

T e s c h e n d o r f stellt in seiner Betrachtung „Oesophaguskarzinom mit Perforation in die Luftwege“ 1920 sechs Fälle zusammen, bei denen es sich in fünf Fällen um Männer handelt, die das 50. Lebensjahr überschritten hatten und in einem Falle um eine 57jährige Frau. Bei dem ersten Kranken war das Symptom des Hustenreizes beim Trinken weniger ausgeprägt. Der Röntgenbefund ergab eine Oesophagusstenose, sowie eine Perforation, durch die der Brei in die Lunge gelangte. Die Sektion ergab ein perforiertes Karzinom mit Lungengangrän. Auch im zweiten Falle trat wiederum Husten mit schäumigem Auswurf nach der Nahrungsaufnahme in den Vordergrund. Beim Sondieren gelangte man in Höhe von 35 cm auf ein Hindernis, so daß anfangs nicht an eine Perforation gedacht wurde. Bei der Röntgendurchleuchtung verteilte sich jedoch der Brei in die beiden Bronchien. Bei der 57jährigen Frau ergab die Röntgendurchleuchtung ebenfalls eine Oesophagotrachealperforation. Der vierte Fall ist wegen des Speiseröhrenkrebses mit Perforation in die Luftröhre bei vorhandener beiderseitiger Lungenspitzen tuberkulose beachtenswert. Fall 5 betrifft einen 55jährigen Arbeiter, der seit einem Jahr unter Schluckbeschwerden und Schmerzen unterhalb des Brustbeines litt. Zuletzt trat jedesmal nach dem Trinken ein heftiger Hustenanfall auf, wobei alles erbrochen

wurde. Bei der Röntgendurchleuchtung ergoß sich der Brei von der Oesophagusstenose aus nach beiden Seiten in den Bronchialbaum. Nach 8 Tagen starb der Patient infolge Lungenödems. Im Fall 6 standen bei einem 65jährigen Manne, der nur noch flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte, ebenfalls wieder starke Hustenanfälle nach der Nahrungsaufnahme im Vordergrund. Bei der Röntgendurchleuchtung sah man nach baldigem Hustenreiz eine Oesophago-trachealperforation an der Stenosestelle. Die Sektion ergab ein perforiertes Oesophaguskarzinom, sowie beiderseitige Unterlappentpneumonie.

Einen weiteren Beitrag zur Kasuistik des Oesophaguskarzinoms, das eine Trachealperforation auslöste, gab Berger im Jahre 1921 in seiner Abhandlung „Perforation der Speiseröhre und Röntgendurchleuchtung“. Es handelte sich um den Futtermeister K. G., der seit 3 Monaten an Heiserkeit und 8 Wochen später an Schluckbeschwerden litt, die ständig zunahmen und so stark wurden, daß der Kranke nur noch flüssige Speisen zu sich nehmen konnte. Gleichzeitig trat starke Gewichtsabnahme ein. Die Sondierung der Speiseröhre ergab in Tiefe von 20 cm einen Widerstand. Bei der ersten Durchleuchtung bestand in dieser Gegend eine Stauung des Röntgenbreies. Von einem Übertritt in die Lungen war nichts sichtbar. Am nächsten Morgen hörte man beim Kaffeetrinken ein gurgelndes Geräusch in der Speiseröhre, was zur zweiten Röntgendurchleuchtung Anlaß gab. Jetzt sah man den Brei, nachdem er anfänglich sich wiederum an der besagten Stelle gestaut hatte, nach einem Kardiospasmus in Bifurkationshöhe sich „reiferbesenartig“ in beide Lungen ergießen. Auffallend war, daß der Kranke im Augenblick des Eintritts von Brei in die Lungen keinen Hustenreiz bzw. Atemnot oder Übelkeit verspürte. Erst nach 2 Minuten traten diese Erscheinungen auf, es setzte eine starke Asphyxie ein, der der Kranke innerhalb kurzer Zeit erlag. Blumberger berichtet 1935 über nachfolgendes Krankheitsbild: Es handelte sich um einen Mann im schlechten Allgemeinzustand. Seit 4 Wochen traten Schluckbeschwerden auf, und seit ca. einer Woche verursachte das Trinken von Flüssigkeiten starken Hustenreiz, sodaß die Flüssigkeitsmenge meist

wieder ausgehustet wurde. Der Röntgenbefund klärte im Zusammenhang mit der ausgesprochenen Kachexie das Krankheitsbild einer Oesophagusperforation in Höhe der Bifurkationsstelle. Sie war ca. ein Zehnpfennigstück groß, unscharf begrenzt und ragte in die Trachea hinein. Ursache der Perforation war ein Speiseröhrenkrebs. Der Kranke überstand in diesem Falle die Röntgendurchleuchtung anstandslos. Nach 6 Wochen starb er an den Folgen allgemeiner Kachexie.

An dritter Stelle soll die Oesophagusperforation besprochen werden, die infolge von Mißbildungen von der Speiseröhre nach der Luftröhre hin zustandekommt. Daher ist es erforderlich, einen kurzen Überblick über die Entwicklungs mißbildungen der Speiseröhre und ihre Beziehung zur angeborenen Oesophagotrachealperforation zu geben. Die Entwicklungsgeschichte läßt uns ihre Entstehungsursache erkennen. Luftröhre und Lunge bilden sich aus dem ventralen Teil des Vorderarmes. Ehe die Abschnürung vollständig wird, bleibt zwischen Luft- und Speiseröhre für einige Zeit ein Spalt bestehen. Tritt in dieser Zeit vor Ende der dritten Woche eine Entwicklungsstörung auf, so führt sie zur Kommunikation zwischen Speise- und Luftröhre. K r e u t e r nahm eine vorübergehende Obliteration des embryonalen Oesophagus an, jedoch nimmt man heute nach S c h m i t z eine rein mechanische Entstehungsart an. Der Vorderdarm biegt sich in der vierten bis fünften Embryonalwoche um die Herzanlage, während gleichzeitig Rückenkrümmung und Nackenbeuge von hinten her wirken. Ist der Druck zu stark, so kann es zur Kommunikation zwischen Luft- und Speiseröhre kommen oder aber, wenn diese beiden Kanäle schon getrennt sind, zur Atresie. Hiernach ergeben sich für unsere folgende Betrachtung zwei wichtige Gruppen. Einmal die Oesophagotrachealkommunikation bei gleichzeitiger Atresie der Speiseröhre und Einmündung des unteren Oesophagusteiles in die Trachea. M a c k e n z i berichtet im Jahre 1884 schon von 43 Fällen einer Perforation zwischen Oesophagus und Trachea bei Atresie des oberen Speiseröhrenabschnittes. H o f f m a n n führte 1899 63 ähnliche Fälle aus der Literatur an. Der älteste stammte aus dem Jahre 1825. K r e u t e r gab für diesen

Typ 1905 98 Fälle an, während nach unserer heutigen Statistik ca. 187 Fälle dieser Mißbildung bekannt sind. Der obere Speiseröhrenabschnitt kann normal entwickelt sein, bzw. endet er in Höhe des Jugulum blind. Nach Sternberg und Rasmussen kommuniziert er in seltenen Fällen durch eine feine Fistel mit der Luftröhre. Der untere Teil mündet vom Magen aus direkt in die Luftröhre. Mit dem oberen Speiseröhrenabschnitt hängt er garnicht oder nur durch einen fibrösen Strang zusammen. Bei der zweiten Gruppe, die jedoch im Vergleich zur ersteren sehr selten ist, kommt es zwischen Speise- und Luftröhre zu einer Kommunikation bei sonst normaler Speiseröhre.

Im folgenden Abschnitt sollen kurz einige interessante Fälle der ersten Gruppe beschrieben werden. Lewen hatte 1888 die Gelegenheit, die Autopsie eines 8 Tage alten Kindes auszuführen, welches die Symptome eines vollständigen Verschlusses des oberen Speiseröhrenabschnittes gezeigt hatte. Derselbe endete divertikelartig. Der untere Abschnitt mündete in Höhe des Kehlkopfinganges in die Trachea. Ähnliche Fälle werden von Schöller, Levy, de Barry und Lufchka aufgeführt. Die Analogie der bis zu Lufchka veröffentlichten Fälle zeigte in der Entwicklungsgeschichte eine gemeinsam begründete Ursache. Die Pathogenese ist von de Barry und Lufchka hauptsächlich erörtert worden. Während de Barry entsprechend der fötalen Kommunikation von Oesophagus und Trachea und der Bildung des Respirationstraktus durch Ausstülpung der Speiseröhre zu der Ansicht kommt, daß man es mit einer Bildungshemmung zu tun habe, hält Lufchka die teilweise Obliteration der Speiseröhre für das primäre und schreibt die Verbindung mit der Luftröhre einer Druckatrophie zu. Im Jahre 1888 veröffentlichte Mekus im Zentralblatt für Gynaekologie nachfolgenden Fall von einem bei Hydramnion geborenen Mädchen, das acht Tage nach der Geburt an den Folgen einer abnorm gebildeten Speiseröhre starb. Die Sektion ergab im oberen Teil derselben eine sackartige Erweiterung, die in Höhe der Bifurkation der Trachea endete. Von der Cardia aus gelangte man mit der Sonde in die Trachea. Hoffmann berichtete 1899 von einem Kinde mit Atresia ani,

Atresia oesophagi und feiner Kommunikation zwischen Speise- und Luftröhre und erörterte das Zustandekommen dieser augenscheinlich nicht gar zu seltenen und bei Lebzeiten wohl zu erkennenden Anomalie. Das Kind starb an den Folgen des schweren operativen Eingriffes.

Giffhorn berichtet im Jahre 1908 von zwei zu unserer Gruppe gehörenden Mißbildungsfällen. Ein kräftig entwickeltes Kind stirbt 3 Tage nach der Geburt. Die Analöffnung fehlt an der normalen Stelle. Dagegen findet sich unmittelbar hinter der Vaginalöffnung ein kleiner Spalt, aus dem sich Meconium entleert. Bei der Nahrungsaufnahme tritt starkes Erbrechen sowie Asphyxie auf. Die Sektion ergibt ein blindes Ende der oberen Oesophagushälfte, die sackartig erweitert ist und in Höhe der Bifurkation ausläuft. Der unter Teil kommuniziert mit der Luftröhre durch eine Öffnung von ca. 3 mm Durchmesser. Im zweiten Falle Giffhorns wird von einem ausgetragenen, kräftig gebauten und gut genährten Kinde berichtet, das sämtliche Nahrung erbricht und nach Gewichtsabnahme am 6. Tage nach der Geburt stirbt. Auch hier ergab die Sektion eine blinde Endigung des Halsteiles der Speiseröhre, die sackartig erweitert war, sowie eine Kommunikation des Brustteiles der Speise- mit der Luftröhre. In dem Falle von Bruel endete der Oesophagus ca. 1,3 cm unterhalb des Ringknorpels blind. Der untere Oesophagusabschnitt setzte sich nach oben direkt in die Trachea fort, etwa in Höhe der Bifurkationsstelle.

In unserer zweiten Gruppe der Entwicklungsmissbildungen sollen einige Fälle beschrieben werden, in denen der Oesophagus im übrigen normal gebildet ist, aber eine Oesophagotrachealperforation besteht. Diese Gruppe ist im Vergleich zur ersteren nach den Angaben der Literatur außerordentlich selten. Richter beschrieb einen derartigen Fall in seiner Inauguraldissertation im Jahre 1792, in dem Oesophagus und Luftröhre miteinander kommunizierten. Pinaud veröffentlichte einen zweiten Fall dieser Gruppe im Jahre 1873. Hier bestand in der Vorderwand des Oesophagus eine Öffnung, die in ihrer Länge 3 cm betrug und in die Luftröhre führte. Außerdem lag noch eine Atresia ani und eine Verbindung zwischen

Darm und Harnröhre vor. Brenner veröffentlichte in Billroths Festschrift im Jahre 1892 einen Fall von Oesophagotrachealfistel und Stenose des Oesophagus, der in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht großes Interesse hat. Es handelte sich um eine 24jährige Frau, bei der Brenner an der Stenosestelle eine Ringfalte fand und darunter eine Oesophagotrachealfistel in Höhe des 6. Halswirbels, die er mit Oesophagotomia externa, Spaltung der Falte und Anfrischung der Fistelränder, Ablösung und Naht der Oesophaguswand erfolgreich behandelte. In Tenons Fall bestand die Perforation im oberen Speiseröhrenabschnitt. Vrolick fand bei einem 5 Tage alten Kinde eine enge Stelle des Oesophagus, die auf die Durchgängigkeit keine nachteilige Wirkung hatte. Knapp über dieser Stenose fand sich eine Perforation mit der Trachea. Eppinger fand in der Leiche eines jungen Mannes an der hinteren Wand der Trachea gerade über der Gabelung eine für einen Katheter durchgehende Öffnung, die von der Speise- nach der Luftröhre hinführte. Lohnes entdeckte bei der Autopsie eines sechs Wochen alten, an Bronchopneumonie gestorbenen Säuglings 3 cm unter dem Aryknorbel eine angeborene Kommunikation zwischen Oesophagus und Trachea. Tarnier und Gilfe veröffentlichten ähnliche Fälle von Oesophago-Trachealperforationsmißbildung bei normaler Speiseröhre. Stübler veröffentlichte 1921 einen sehr interessanten Fall aus dem Heidelberger Pathologischen Institut. Es handelte sich um ein zwei Tage altes Kind weiblichen Geschlechtes, das sämtliche Zeichen der Reife trug. Nach der Geburt war starke Dyspnoe aufgetreten. Die Nahrung wurde erbrochen, beim Trinken trat starke Dyspnoe auf, sodaß an ein kongenitales Vitium gedacht wurde, da faktisch auch eine Verbreiterung des Herzschattens nach rechts bestand. Der Sektionsbefund ergab einen offenen Ductus Botalli; das Foramen ovale ist zweifach schlitzförmig offen, sämtliche Klappen und Segel sind intakt. In der Vorderwand des Oesophagus befindet sich 3,3 cm unterhalb der Stellknorpel eine ovale Perforation, die in die Trachea führt, sodaß vom Oesophagus aus die Knorpelringe der vorderen Trachealwand sichtbar sind.

In der Aetiologie der Oesophagotrachealperforation soll die

Tuberkulose der Speiseröhre an vierter Stelle besprochen werden. Sie ist jedoch erst in jüngerer Zeit einwandfrei festgestellt worden und zwar meistens bei Kranken, die das 30. Lebensjahr überschritten hatten. Es wurden wiederholt Zusammenstellungen über Oesophagustuberkulose gemacht. Ich erwähne die letzte von Gardère, in der ca. 70 Fälle von Speiseröhrentuberkulose angeführt sind. In der Regel tritt sie selten allein auf; häufig besteht eine Lungentuberkulose oder eine Tuberkulose anderer Organe. An Hand der beobachteten Sektionsfälle kommt die Speiseröhrentuberkulose vielfach durch Verschlucken tuberkulösen Sputums bei geschwächter Widerstandsfähigkeit der Speiseröhrenschleimhaut zustande, oder sie tritt nach Eppinger in Kombination mit Krebs oder Soor auf. Gelegentlich greift die Tuberkulose vom Pharynx bzw. Larynx auf die Speiseröhrenschleimhaut über. Vereinzelt kommt sie auf dem haematogenen Wege zur Ausbreitung. Ausnahmsweise ausgedehnte tuberkulöse Geschwüre im mittleren Teil der Speiseröhre wurden von Mullings und Kümmele beobachtet. Ist die Widerstandskraft der hinteren Oesophaguswand durch den tuberkulösen, ulzerösen Prozeß herabgesetzt, so kommt es an der dünnsten Stelle zur Perforation in die Trachea. Meist ist jedoch das tuberkulöse Geschwür der Speiseröhre oberflächlich, sodaß es nicht zur Perforation kommt. Guiséz beschrieb eine derartige Perforation, die von einem tuberkulösen Geschwür der hinteren Oesophaguswand ausging und mit der Trachea eine Kommunikation gebildet hatte. Im Jahre 1869 veröffentlichte Aufrecht nachfolgenden Fall: Ein 53jähriger Lungenkranker bekam eine Halsdrüsen-schwellung, wovon eine, unterhalb des Schildknorpels gelegene, Anfang Januar 1868 geöffnet wurde. Aus der Schnittwunde trat dünner Eiter, gegen Ende März beim Sprechen und Husten auch Luft aus, zuletzt trat nach jeder Flüssigkeitsaufnahme ein heftiger Hustenanfall auf, wodurch die Flüssigkeitsmenge größtenteils ausgehustet wurde. Die Sektion ergab eine Oesophagotrachealkommunikation, die von einer zwischen Oesophagus und Trachea ca. haselnußgroßen tuberkulösen Lymphdrüse, die schiefergrau gefärbt war, ausging.

Brie f veröffentlichte im Jahre 1936 in seiner Abhandlung „Zur Klinik und Röntgenologie der Oesophago-Trachealfistel“ nachfolgenden Fall: Es handelte sich um einen 13jährigen Jungen, der im 11. Lebensjahre bereits an Skrophulose gelitten und seit längerer Zeit einen Lupus an der Nase hatte. Nach den Angaben hatte der Junge schon seit frühester Jugend beim Essen husten müssen und in dem Auswurf wiederholt Nahrungssteile bemerkt. Bei der Röntgendurchleuchtung staute sich der Bariumbrei oberhalb der Kardia auf, und in Höhe des vierten Brustwirbels lief derselbe in den Bronchialbaum über. Sofort nach der Füllung setzte ein kräftiger Husten ein, der den Bariumbrei nach außen hin entleerte. Interessant an diesem Falle ist, daß der Übertritt von Röntgenbrei in die Lunge stets an einen Cardiospasmus gebunden war, da bei offener Kardia der Brei zumeist in den Magen lief.

Eine untergeordnete Stellung in der Aetiologie der Oesophago-trachealperforation nimmt die Aktinomykose ein, die der Vollständigkeit halber hier auch mitangeführt werden soll. So berichteten P o n c e t und B e r a r d aus dem Jahre 1896 über einen Fall von Aktinomykose, die eine Oesophagotrachealfistel verursacht hatte, die zur Heilung kam. P o n c e t kratzte mit dem scharfen Löffel die Ränder der Fistel ab und vernähte die Öffnung, wodurch Heilung erzielt wurde. V i n s o n und S u t h e r l a n d konnten eine zweite Perforation obiger Aetiologie beobachten, die von einem aktinomykotischen Prozeß des oberen Mediastinum auf die Oesophagotrachealwand übergegangen war.

Eine Sonderstellung in der Entstehungsursache der Speiseröhren- und Luftröhrenperforation nimmt die Lues ein. Neben den diagnostischen Hilfsmitteln steht nach Bekanntsein der üblichen Symptome die W a f f e r m a n n'sche Reaktion im Vordergrund. Vielfach kann man auch ex juvantibus die Diagnose Lues stellen. Das Krankheitsbild obiger Perforation aufluetischer Basis ist daher bezüglich der Heilung sehr wichtig und wissenswert. Einen nicht allzugroßen Defekt in der Speise- bzw. Luftröhre kann man mittels antiluetischer Behandlung vollständig heilen. Luetische Oesophagotrachealfisteln wurden von B e r g e r, K o p p, K r a u s, v. N a v r a -

til, Kay-Sandall, Curschmann, Moritz, Sonntag, Schmiegelow, Bafch, Schmilinsky, Schütze, Wallmann, Tliffier-Favel und v. Tannenhain beschrieben. Im folgenden werden einige Krankheitsbilder aus der beschriebenen Reihe herausgegriffen:

v. Navratil veröffentlichte 1904 nachfolgenden Fall: Am 27. 9. 1903 wurde ein Kranker, dessen Krankengeschichte für Tuberkulose sprach, in kachektischem Allgemeinzustand eingeliefert. Die Oesophagoskopie ergab eine Oesophagotrachealfistel. Um den Allgemeinzustand zu heben, wurde eine Gastrotomie angelegt. Die Operation wurde gut überstanden, aber trotzdem verfiel der Patient zusehends und starb am 7. Oktober. Die Autopsie ergab eine Oesophagotrachealperforation, die durch ein Gumma zustande gekommen war. v. Navratil versuchte damals auf Grund von Tierversuchen derartige Fisteln zu schließen, indem er die Speiseröhre durch extramuköse Tabaksbeutelnaht verschloß und die Schilddrüse zwischen Speise- und Luftröhre zur Sicherung der Naht verlegte. Pfeiffer und v. Hacker haben mit dieser Methode gute Erfolge erzielt.

Schmilinsky berichtete 1905 über nachfolgenden instruktiven Fall einer Oesophagusperforation in die Trachea auf Grund einer Lues der Speiseröhre: Ein 32jähriger Mann mit alter Lues bekam 1905 nach mehrwöchentlichem Fieber anfangs nach flüssigen, später nach allen Speisen Verschlucken, das sich in Husten und Erbrechen äußerte. Nach vierwöchentlicher Schmierkur und Sondenernährung konnte der Patient wieder feste Speisen schlucken, während er sich nach Aufnahme von Flüssigkeiten immer verschluckte. Nach $1\frac{1}{2}$ Jahren bestand noch derselbe Zustand. An Hand des Gerhardt'schen Versuches wurde eine Perforation vom Oesophagus nach der Trachea festgestellt, die ca. 20 cm von der Zahnreihe entfernt war. Die Oesophagoskopie bestätigte den Befund als eine erbsengroße Öffnung, die einer gummösen Infiltration glich, wie man sie bisweilen im Gaumen findet. Der Kranke hatte durch bestimmte Körperhaltung beim Essen gelernt, das Hineingelangen der Speisen in die Luftröhre zu verhindern.

Ich selbst hatte in der Praxis Gelegenheit, eine Perforation zwischen Oesophagus und Trachea längere Zeit hindurch zu beobachten und zu behandeln. Blumberger führt den von mir f. Zt. beobachteten Fall in seiner Abhandlung „Oesophago-tracheale Fisteln und ihre Ätiologie“ mit an. Da ich auch 1936 während meiner Vertretungszeit den Kranken behandelte, möchte ich an dieser Stelle ausführlich über meine Beobachtungen an Hand der Krankengeschichte berichten.

Es handelt sich um den 64jährigen H. A. aus S. Beide Eltern waren an Altersschwäche gestorben, drei Geschwister leben und sind gesund. Sonst ist nichts Besonderes in der Familienanamnese anzuführen. An Kinderkrankheiten hat der Patient die Masern gehabt. Sonstige Krankheiten — auch während der Schulzeit — waren nicht erinnerlich. Vom 18. bis 21. Lebensjahr hat der Kranke in Südamerika gelebt. Von einer Infectio veneris während dieser Zeit bzw. in den späteren Jahren war ihm nichts bekannt. Seit ungefähr zwei Jahren spürte er keine rechte Kraft mehr in den Beinen und war ihrer bisweilen nicht mehr mächtig. Bei längerem Gehen ermüdete er immer sehr schnell, längeres Stehen war fast gar nicht mehr möglich. In der letzten Zeit konnte der Kranke nur noch am Stocke gehen. Ferner gab der Kranke an, daß seit einigen Jahren ein heftiger „Erstickungshusten“ bestehe, der hauptsächlich nach Nahrungsaufnahme, insbesondere jedoch nach dem Trinken von Flüssigkeiten auftrete. In dem Ausgehusteten glaubte er bisweilen winzige Speiserefte gesehen zu haben. Der Husten sei vielfach von starken und beklemmenden Brustschmerzen begleitet gewesen. Letztere habe er auch wiederholt in der hustenfreien Zeit beobachtet. Der Kranke nimmt jetzt wegen der Beschwerden und Schmerzen beim Wasserlassen ärztliche Hilfe in Anspruch.

Befund: Es handelt sich um einen mittelgroßen Mann in mittlerem Ernährungs- und Kräftezustand. Die Haut und die Schleimhäute sind blaß und wenig durchblutet, die erste ist in Falten abhebbar und ziemlich trocken. An der Muskulatur, dem Lymphdrüsen-system, den Atmungs- und Verdauungsorganen, sowie dem Skelett und dem Urogenitalsystem sind, außer einer geringen Schwellung

des rechten Prostatalappens, keine krankhaften Veränderungen nachweisbar.

Kopf: Beide Pupillen sind ungleich groß und verzogen, reagieren weder auf Lichteinfall noch auf Nahesehen. Trigeminus und Facialis sind ohne Besonderheiten. Gebiß und Zähne sind schlecht und lückenhaft. Ohren: Rechtes Trommelfell und Gehörgang sind o. B. Es besteht Taubheit auf dem rechten Ohr. Das linke Trommelfell ist trübe und zeigt eine kleine Narbenbildung. Das Hörvermögen ist für alle Töne herabgesetzt. Die Ursache besteht in einer zentralbedingten Schwerhörigkeit.

Hals: Er ist nach allen Seiten hin frei beweglich, Drüsen sind nicht tastbar. Halsorgane o. B. Recurrenslähmung ist nicht vorhanden.

Herz: Es liegt eine geringe Verbreiterung nach links vor, die Herztöne sind regelmäßig und rein, jedoch leise. Der zweite Aortenton ist betont, die Schlagfolge ist voll und regelmäßig, der Blutdruck nach Riva-Rocci beträgt 130/80 mm Hg.

Reflexe: Die Patellarreflexe sind nicht auslösbar, das Romberg'sche Phänomen ist positiv. Der Gang ist stampfend, ataktisch, nur am Stock möglich.

Der Urin ist etwas trübe, Reaktion sauer, Farbe gelb, Eiweiß Spur. Er ist frei von Zucker, Urobilin und Urobilinogen. Im Schleuderfatz finden sich massenhaft Leukozyten und Bakterien.

Blutbild: Haemoglobin 78%, rote Blutkörperchen 4,5 Mill., weiße Blutkörperchen 7000, der Färbeindex beträgt 0,8. Das übrige Blutbild ist normal; ebenfalls besteht keine Linksverschiebung. Die Senkungszeit der roten Blutkörperchen nach Linzenmeier ist nicht beschleunigt, sie beträgt über fünf Stunden.

Die Wassermann'sche Reaktion im Blute ist positiv. Die Lumbalpunktion ergibt einen gesteigerten Druck von 170 und eine positive Pandy'sche Reaktion. Die Reaktion nach Nonne Apelt ist negativ. Es besteht eine Zellvermehrung von 36/3. Die Goldsolreaktion ergibt eine für Tabes dorsalis typische Kurve.

Die fraktionierte Magenlastbestimmung ergibt für die freie Salzsäure 54 und für die Gesamt-Acidität einen Wert von 84.

Die in der Vorgeschichte angegebenen Schluck- und Hustenbeschwerden ließen an eine Perforation bzw. Kommunikation zwischen Speise- und Luftröhre denken. Da dem Patienten wegen seines schlechten Allgemeinzustandes keine Oesophagoskopie zugemutet werden konnte, wurde davon Abstand genommen und statt dessen eine Röntgenuntersuchung zur Erhärtung der vermutlichen Diagnose vorgenommen. Nach einem Schluck des dünnflüssigen Bariumbreies entleerte sich derselbe in Höhe der Bifurkationsstelle durch eine etwa erbsengroße Öffnung in die Trachea und füllte beide Bronchialäste gleichzeitig bis in die feinsten Verzweigungen. Der Kranke bekam anschließend einen starken Hustenanfall, wodurch der Bariumbrei wieder nach außen hin befördert wurde. Eine weitere Komplikation von seiten des Kranken trat während der Durchleuchtung bzw. nach der Durchleuchtung nicht auf. Die Speiseröhre zeigte sich etwas breit, eine Ausparung bzw. Vorwölbung war an der Perforationsstelle nicht zu sehen. Magen und Dünndarm waren o. B. Bei der Durchsicht im ersten schrägen Durchmesser war die mit Bariumsuppe gefüllte Trachea mit den beiden Bronchialstämmen und ihren feineren Verzweigungen noch deutlicher sichtbar. Es handelt sich in meinem Falle um eine *Tabes dorsalis* und eine gleichzeitige Perforation zwischen Speise- und Luftröhre, die von einem Gumma der Speiseröhre ausging.

Bekanntlich ist die Lues der Speiseröhre selten, dieses ist um so auffälliger, als luetische Ulzerationen der Mundschleimhaut und des Rachens gar nicht so selten sind. Julien berichtete 1886 von 19 Fällen, bisher sind ihrer etwa 60 bekannt. Die Syphilis der Speiseröhre, bei der es zur Perforation zwischen den beiden Hohlorganen kommt, tritt zumeist in sekundärer und tertiärer Form als Plaque und Gumma auf und ist vielfach sehr schmerzhaft. Auch in meinem Falle hatte der Patient bisweilen über heftige Schmerzen zu klagen, die selbst in der hustenfreien Zeit bestanden. Virchow beschrieb als erster die charakteristischen gummösen Ulzerationen an drei beobachteten Fällen. Nach Jusscheinen die drei physiologischen Engen für die Lokalisation besonders bevorzugt zu sein. In meinem

Falle war die mittlere bzw. die Bifurkationshöhe der Sitz der Ulzeration, die zur Perforation führte.

Pathologisch, anatomisch entsteht das Gumma in der Speiseröhre submucös, bildet circumskripte, geschwulstartige Schwellungen, die zentral einschnürten und dann scharf ausgestanzte Geschwüre darstellen mit nekrotischem Grund. Sitzt das Gumma wie in meinem Falle an der Vorderwand der Speiseröhre oder an der Hinterwand der Luftröhre, so kann es infolge der Anlagerung der beiden Organe, wie in meinem beobachteten Falle, zum Durchbruch in das andere Hohlorgan kommen, was für den Kranken bisweilen eine große Lebensgefahr bedeuten kann. Auffallend ist in meinem Falle das vermutliche Bestehen der Perforation seit einigen Jahren, ohne daß es zu einer Bronchopneumonie bzw. Lungengangrän gekommen ist. Ebenfalls ist beachtenswert, daß der Kranke die Röntgenuntersuchung ohne lebensbedrohliche Komplikation überstand, was nach den Angaben der Literatur und den bis dahin beobachteten Fällen wohl auch zur Seltenheit gehört. Auf Grund einer gut aufgenommenen Anamnese war es in meinem Falle möglich, eine Oesophagotrachealperforation zu vermuten, die eine sehr vorsichtige Röntgenuntersuchung folgern ließ. Bei wahllosem Breischlucken hätte — wie in anderen bis dahin beobachteten Fällen — der Kranke die Röntgenuntersuchung vielleicht nicht ohne ernstliche Komplikationen überstanden.

Differentialdiagnostisch konnte man beim Bestehen der Tabes dorsalis an eine Lähmung des Kehldeckels denken, die durch das Verschlucken eine Perforation bzw. Kommunikation zwischen Speise- und Luftröhre hätte vortäuschen können. Diese Lähmung ist jedoch durch die laryngologische Untersuchung und den einwandfreien röntgenologischen Befund ausgeschlossen.

Die Diagnose der luetischen Perforation wurde auch durch den Erfolg der spezifischen Behandlung noch erhärtet. Der Kranke bekam reichlich Jodkali, täglich bis zu 1 gr, ferner Neosalvarfan (5,5 gr) und Bismogenol (ca. 20 gr). Anschließend an die kombinierte Neosalvarfan-Bismogenolkur wurde eine Fieberkur mit Pyrifor durchgeführt, die recht kräftige Schüttelfröste mit einem Fieber bis zu 41

Grad hervorrief. Die Kontrolldurchleuchtung nach Ablauf der spezifischen Behandlung ließ die bei der ersten Durchleuchtung festgestellte Perforation zwischen Speise- und Luftröhre nicht mehr erkennen. Das Trinken des Röntgenbreies verursachte jetzt keinen Hustenreiz mehr, der Brei passierte glatt die Speiseröhre.

Ich hatte Gelegenheit, den Kranken im Februar und November 1936 wieder zu untersuchen und zu behandeln. Von einem Druckgefühl bzw. Schmerzen hinter dem Brustbein ist dem Patienten in der Zwischenzeit nichts mehr bekannt geworden. Der Appetit ist gut die Nahrungs-, sowie Flüssigkeitsaufnahme gelingt anstandslos ohne Hustenanfall und Schluckbeschwerden. Es besteht kein Hustenreiz mehr nach der Nahrungsaufnahme. Auch die Kontrolldurchleuchtungen zeigen glatte Passage des Bariumbreies durch die Speiseröhre in den Magen. Die Perforation ist nicht mehr nachweisbar. Die Wassermann'sche Reaktion ist jedoch noch positiv im Februar wie im November 1936. Die Erscheinungen der Ataxie sind ebenfalls stationär geblieben. Der Kranke geht meistens mit Stock, jedoch kann er auch einige Schritte ohne Stock gehen.

Ich fand in der mir zur Verfügung stehenden Literatur keinen annähernd gleichen Fall. Obige Beobachtung bedarf auch wegen der Eigenart ihrer Entstehungsursache der besonderen Würdigung. Bei dem ausgesprochenen Krankheitsbilde einer Tabes dorsalis bestand eine Perforation zwischen Oesophagus und Trachea, die durch ein zerfallenes Gumma bedingt war. Während ich die Perforation durch die spezifische Behandlung heilte, wurde das Hauptkrankheitsbild nicht wesentlich beeinflusst.

Außer der Perforation, die ihren Ursprung in primären Erkrankungen bzw. Dekubitalgeschwüren der Speiseröhre findet, ist auch der Krankheitsbilder zu gedenken, die durch primären Defekt der hinteren Luftröhrenwand in die vordere Speiseröhrenwand perforieren und so zwischen den beiden Hohlorganen eine Kommunikation herstellen. Das Krankheitsbild der primären Luftröhrenperforation, das im Vergleich zur ersten Hauptgruppe zahlenmäßig bedeutend geringer ist, muß der Vollständigkeit halber, da es einwandfrei beobachtet wurde, in dem gestellten Thema behandelt werden. Es er-

übrigt sich jedoch der wenigen einwandfreien Krankheitsfälle wegen, verschiedene Untergruppen in der Besprechung anzuführen. Vielmehr sollen der Übersicht halber sämtliche Fälle der primären Trachealperforation in den Oesophagus hinein in einem Hauptpunkte besprochen werden, und zwar in der der ersten Hauptgruppe entsprechenden Reihenfolge.

Chassaignac und v. Hacker fahen je eine Perforation zwischen Luft- und Speiseröhre bei der von anderen nicht kunstgerecht ausgeführten Tracheotomie, die dadurch zustande gekommen war, daß die Kanüle in beiden Fällen die hintere Luftröhrenwand und die vordere Speiseröhrenwand durchbohrt hatte. Man könnte diese beiden Fälle als durch Trauma bedingt ansehen. Von direktem Trauma fand ich in der gesamten Literatur als einzigen Fall den von Pieniazek aus dem Jahre 1901. Das direkte Trauma traf gleichzeitig die Luft- und Speiseröhre, wodurch eine Perforation zwischen Trachea und Oesophagus entstand. Pieniazek entfernte bei der Operation ein Laryngosclerom aus dem Kehlkopf mit der Cooper'schen Schere und schnitt dabei ein Stück aus der hinteren Wand der Trachea mit heraus, so daß er zufällig eine Kommunikation zwischen Luft- und Speiseröhre setzte. Diese künstlich gesetzte Perforation wurde sofort mit mehreren Nähten vereinigt, und die Wunde heilte **per primam**.

Die Kenntnis von den Halsverletzungen stützt sich auf die Beobachtungen hinter der Front. Unsere Erfahrungen über die unmittelbaren Folgeerscheinungen nach der Verletzung sind noch dürftig. Das Schicksal des Verwundeten hängt von der ersten Behandlung ab. Erkes berichtet 1918 in seiner Abhandlung „Über Schußverletzungen der Luft- und Speisewege am Hals“ über sieben Fälle, die zur Beobachtung kamen. Es handelt sich jedoch nur in zwei Fällen um gleichzeitige Verletzung des Kehlkopfes bzw. der Trachea und Speiseröhre durch Gewehrscuß. Diese beiden Fälle kamen drei bis acht Stunden nach der Verwundung unter dem Bilde schwerer septischer Infektion zur Aufnahme. Bei dem ersten Verwundeten, der unter stärkster Atemnot litt, wurde gleich eine Tracheotomie gemacht. An eine Verletzung der Speiseröhre wurde

nicht gedacht. Diese wurde durch die Autopsie entdeckt. Der zweite Verwundete hatte Schluckbeschwerden und kam unter richtiger Diagnose zur Operation. Die Wunde der Trachea und die des Oesophagus wurden an beiden Seiten des Halses in Lokalanästhesie freigelegt und chirurgisch versorgt. Auch dieser Kranke starb. Die Sektion beider Fälle ergab ein gangränöses, mißfarbiges Mediastinum, von zahlreichen Luftbläschen durchsetzt, sowie eine Bronchopneumonie. Aus den beiden angeführten Schußverletzungen ist die große Gefahr der Aspirationspneumonie und Mediastinitis an Hand der ausgeführten Autopsie leicht ersichtlich.

Sargnon und Guisez zeigen in ihren Statistiken aus dem Weltkriege, daß unter den Verwundungen der oberen Luftwege mit blanker Waffe (bzw. Stich- und Schußwunden) nur etwa 10% die Speiseröhre betreffen. Verläuft der Wundkanal von vorn nach hinten, so kommt es zur Perforation zwischen Luft- und Speiseröhre. Billroth sah bei einem Selbstmörder eine Perforation der Luft- und Speiseröhre durch einen Dolchstoß. Krassnig entfernte operativ einen Geschoßsplitter, der vor der Halswirbelsäule lag und Trachea und Oesophagus perforiert hatte. Die Verletzung heilte natürlich ohne Fistelbildung. Smoler berichtet über eine seitliche und quere Eröffnung der Trachea mit Stichverletzung der Speiseröhre, die durch Fallen auf eine zerbrochene Flasche entstanden war, was auch eine nicht alltägliche Beobachtung ist. Der Fall kam nach dreiwöchentlicher Behandlung zur Heilung. Schüller fand 1877 für die hauptsächlich Luft- und Speiseröhre betreffenden Verletzungen in 48 zusammengestellten Fällen eine Mortalität von 8, d. h. 16%. Unter den angeführten Verletzungen waren fünf Tracheo-oesophagealfisteln, eine beobachtete er selbst. Dann beschreibt v. Hacker einen sehr interessanten Fall einer Tracheo-oesophagealkommunikation, die durch einen Revolverschuß bedingt war. Hierbei war das durch die Schilddrüse und rechte Trachealwand eingedrungene Geschoß in dem Zwischenraum steckengeblieben. Der älteste durch Fremdkörperverletzung bedingte Fall von Luft- und Speiseröhrenperforation ist der von Trioen aus dem Jahre 1821. Hier wird von einem Soldaten berichtet, der unter der Cartilago

thyreoidea einen Flintenschuß erhielt, wobei die Kugel den oberen Teil der Luftröhre ganz und die Speiseröhre zur Hälfte zerstört hatte. Die Wunde schloß sich nach chirurgischer Behandlung nicht vollkommen, sondern es blieb eine breite fistulöse Öffnung zwischen Trachea und Oesophagus bestehen.

In die Kategorie der Fremdkörper, von denen zuvor die Rede war, kann man das Trauma mit einreihen. Zwar sind hier nicht so sehr die direkten Traumen, als vielmehr die indirekten Traumen gemeint, die eine Perforation zwischen Trachea und Oesophagus je nach ihrem Sitz bisweilen auslösen können. Ferner sollen im folgenden noch einige andere Beispiele von Verletzungen gezeigt werden, die im Anschluß an das Trauma zur Perforation geführt haben.

Henschen veröffentlichte im Jahre 1876 folgenden interessanten Fall: Es handelt sich um einen 43jährigen Bauer, der sich beim Selbstmordversuch den Hals mit einem „schweren“ Messer durchschnitten und dabei den Larynx, die Speiseröhre und selbst die Fascia praevertebralis vollständig durchbohrt hatte. Die Wunde war derartig klaffend, daß man bei zurückgebeugtem Kopf die Faust darin verstecken konnte. Die großen Gefäße waren nicht verletzt. Es gelang nach zweimonatlicher Behandlung eine Besserung des Zustandes herbeizuführen. Der Patient konnte wieder schlucken. Jedoch blieb an der Verletzungsstelle eine Trachea-Oesophagealfistel zurück. In Gairdner's Fall war durch eine quer über den Hals verlaufene Schnittwunde die Trachea vollkommen, die Speiseröhre zum größten Teil durchschnitten. Die Ernährung geschah durch die Schlundsonde. Es entwickelte sich im Verlauf der Heilung eine starke Narbenkontraktur in der Umgebung der Trachea, die Erstickungsanfälle folgerte. Es wurde eine Trachealkanüle eingelegt, die Patientin wurde durch die Oesophagusfistel gefüttert. In dem von Dupuytren beschriebenen Fall handelt es sich um einen 23jährigen Mann, der Selbstmordversuch gemacht hatte und sich eine Larynx-Pharynxfistel beigebracht hatte, deren plastischer Verschuß versucht wurde.

Es kann auch gelegentlich von der hinteren Luftröhrenwand aus eine Perforation durch Carcinom in die Speiseröhre erfolgen. In

diesem Zusammenhang soll auf die Beobachtung von W i d m a n n aus dem Jahre 1921 näher eingegangen werden: Es handelte sich um einen 49jährigen Mann, der wegen Schmerzen hinter dem Brustbein ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. Gleichzeitig bekam er Husten mit übelriechendem, blutigem Auswurf, dessen Herkunft man auf die Speiseröhre bezog. Der Kranke starb an den Erscheinungen einer Lungenentzündung. Die Sektion ergab eine eitrige, jauchige Entzündung beider Lungen. Zwischen Luft- und Speiseröhre befand sich eine ca. kleinfingerdicke Perforation. Die Luftröhre war in ziemlicher Ausdehnung von einer Geschwulst befallen, die erweicht und zerfallen war. Dadurch wurde eine Kommunikation zwischen Luft- und Speiseröhre hergestellt. Die Schleimhaut der Trachea war stark gerötet. Die Lymphdrüsen in der Umgebung der Luftröhre waren in derbe ca. haselnußgroße Knoten umgewandelt. Es handelte sich nach histologischer Untersuchung um einen Plattenepithelkrebs, der von der Luftröhre ausgegangen, in die Speiseröhre hineingewachsen war und durch seinen Zerfall eine Perforation zwischen den beiden Hohlorganen ausgelöst hatte.

Die angeborene Perforationsbildung, die primär von der Hinterwand der Luftröhre ausgeht und nach der Vorderwand der Speiseröhre führt, ist relativ seltener als im umgekehrten Sinne. Bei der Durchsicht der Literatur fand ich die primäre Trachealperforation nach dem Oesophagus hin bei vorhandener Atresie des Oesophagus nicht vertreten. Es sind jedoch einzelne Fälle von primärer Trachealperforation bei sonst normalem Oesophagus beschrieben.

L a m b fand 1873 ein etwa sechs Wochen altes Kind mit schmerzhafter Flatulenz, das täglich einige dünne Stühle entleerte. Die Atmung war stark beschleunigt, zeitweise bis 70mal in der Minute und war von Auf- und Abwärtsbewegung des Kopfes begleitet. Bisweilen trat auch etwas unregelmäßiger und kurzer Husten beim Trinken auf. Die Sektion ergab eine rechtsseitige Pneumonie. In der hinteren Trachealwand befand sich in der Mittellinie, einen halben Zoll über dem unteren Rande der Cartilago cricoidea, eine Fistelbildung, die drei Linien lang und eine Linie breit war. Von dieser führte ein Fistelgang nach hinten und unten in die

Speiseröhre, in der die Öffnung tiefer lag. Durch die dichte Aneinanderlagerung der Fistelwunden war die Gefahr des Eintritts von Speisen in die Trachea einigermaßen verhütet worden.

R i b b e r t veröffentlichte einen ähnlichen Fall: Er fand bei einem vierjährigen Kinde, das seit seiner Geburt an Dyspnoe litt, eine Perforation, die von der Trachealwand ausging und in den Oesophagus mündete. Sie sah aus wie ein Traktionsdivertikel. Bemerkenswert ist das Fehlen der Stimmbänder bei engem Kehlkopf.

W i d m a n n berichtete 1921 von einer angeborenen Tracheo-oesophagealperforation, die erst durch Autopsie bei einem 34 Jahre alten Landsturmrekruten entdeckt wurde. Die Perforation fand sich an der Hinterwand der Luftröhre, wo sie in Höhe des zehnten Knorpelringes bleistift dick begann und steil nach abwärts in die Vorderwand der Speiseröhre zwischen den beiden Stellknorpeln, ca. 7,7 cm unterhalb der Einbuchtung kommunizierte. Es gelang mit der geknüpften Sonde die Perforation ohne weiteres zu sondieren.

Im Jahre 1925 beschrieb M e i l i eine spaltförmige laryngo-tracheo-oesophageale Kommunikation, die nach fünf Tagen zur tödlichen Schluckpneumonie führte und als Folge einer unvollständigen Abpaltung des kranialsten Abschnittes der tracheo-oesophagealen Rinne aufzufassen war.

Die Luftröhre wird von der Syphilis viel seltener befallen als der Kehlkopf. Nach S c h r ö t t e r befällt von den syphilitischen Erkrankungen das Gumma und das aus seinem Zerfall resultierende Geschwür am häufigsten die Luftröhre. Zumeist sind es diffuse Verdickungen größerer Bezirke, nur ausnahmsweise scharf umschriebene prominente Tumoren. Bezüglich ihrer Lokalisation nimmt die Bifurkation die erste Stelle ein, danach der Anfangsteil und zuletzt das Mittelfstück. Greift der gummöse Prozeß von der Trachea auf die Speiseröhre über, so kommt es anschließend zu einer Perforation.

K r a u s veröffentlichte im Auftrage von P a l t a u f im Jahre 1902 einen interessanten Fall, der kurz angeführt werden soll: Ein 48jähriger Mann klagte seit kurzer Zeit über Schluckbeschwerden

und vermochte feste und flüssige Speisen nicht mehr zu sich zu nehmen. Wenn der Kranke Milch trank, hustete er sie teilweise mit dem Auswurf aus. Nebenbei bestanden Hautnarben. Die Magenfonde paßierte glatt die Speiseröhre, ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Der Patient wurde von Tag zu Tag schwächer und starb. Die Autopsie ergab eine Trachea, in der durch syphilitische Ulcerationen eine umfangreiche Kommunikation mit der Speiseröhre zustandegekommen war. Die Trachealschleimhaut war geschwollen und hatte mehrere scharfrandige, syphilitische Geschwüre. Die Speiseröhrenwand zeigte außer der Perforationsstelle keine nennenswerten Veränderungen. Es handelte sich somit im Paltauf'schen Falle um eine primäre Lues der Trachea, die an einer Stelle in den Oesophagus perforiert war.

Im Jahre 1920 berichtete Krassnig in seiner Abhandlung „Luetische Tracheo-oesophagusfistel“ von einem 53jährigen Werkarbeiter, der seit 1½ Jahren an einem Halsleiden litt, das sich in Heiserkeit und geringer Atemnot ohne Schmerzen und Schluckbeschwerden äußerte. Der laryngoskopische Befund ergab ein unbewegliches Stimmband links. Die Tracheoskopie deckte eine starke Einengung der Luftröhre unmittelbar unter den Stimmbändern auf. Die ganze Trachealwand war von einem derben, höckerigen, tiefroten Infiltrat durchsetzt. Die Wassermann'sche Reaktion im Blute war stark positiv. Nach Erhebung des Befundes wurde eine spezifische Kur eingeleitet. Eines Tages hustete der Kranke ein Knochenkonkrement aus, das einem Sequester glich und ca. 14:12:2 mm groß war. Nach diesem Ereignis bekam der Patient nach der Nahrungsaufnahme, insbesondere aber nach dem Trinken von Flüssigkeiten, intensiven Hustenreiz und hustete die aufgenommene Nahrung meistens wieder aus. Der Allgemeinzustand des Kranken wurde von Tag zu Tag schlechter. Er starb an den Erscheinungen einer Pneumonie. Die Autopsie ergab an der hinteren Luftröhrenwand, ca. handbreit unterhalb der Stimmbänder, ein kreisrundes Loch von einem Zentimeter Durchmesser, das scharf begrenzt war und trichterförmig in die Speiseröhre einmündete. Der linke Recurrens ist neben dieser Stelle in derbes Schwielen Gewebe einge-

bettet und von seiner Umgebung nicht mehr als Nerv zu unterscheiden. Als Todesursache wurde eine Aspirationspneumonie gefunden, die bereits rechts zu einer beginnenden Lungengangraen geführt hatte.

Im nachfolgenden soll die Differentialdiagnose an Hand eindeutiger Krankheitsbilder kurz berücksichtigt werden. Obwohl eine Perforation in dem besprochenen Sinne nicht vorhanden zu sein braucht, kann es doch gelegentlich zu Erscheinungen kommen, die einer solchen sehr ähnlich sehen. Daher ist es wichtig, nachfolgende Krankheitsbilder genau zu erkennen. Einmal kann bei einer Kehldackellähmung bzw. einer hochsitzenden Oesophagusstenose mit Recurrenslähmung eine Perforation vorgetäuscht werden. Man kann durch eine gut erhobene Anamnese und den laryngoskopischen Untersuchungsbefund der Diagnose näherkommen und dieselbe durch die Oesophagoskopie bzw. durch vorsichtige Röntgenuntersuchung erhärten.

Weingärtner berichtete in der Berliner Laryngologischen Gesellschaft am 13. Juni 1913 über nachfolgenden Fall: Es handelte sich um einen Patienten, der an einem sicher gestellten hochsitzenden Oesophaguskarzinom mit sehr starker Stenose litt. Sobald der Patient eine gewisse Menge Kontrastbrei vor dem Röntgenschild geschluckt hatte, bekam er einen starken Hustenanfall. Ein kleiner Teil des Breies ergoß sich in den rechten Bronchus und wurde nach kurzer Zeit wieder ausgehustet. Eine Perforation konnte mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Kehlkopfuntersuchung ergab eine linksseitige Recurrenslähmung. Der Übertritt von Bariumbrei kam dadurch zustande, daß der Oesophagus gewissermaßen oberhalb der Stenose sich füllte und durch den Kehldackel sich in die Trachea ergoß. Über einen zweiten Fall berichtete Weingärtner im November 1913 in der Hufeland'schen Gesellschaft. Es handelte sich hier um einen 62jährigen Mann, der in Höhe der Bifurkationsstelle ein Oesophaguskarzinom hatte, das eine starke Stenose auslöste. Eine Perforation wurde mit Sicherheit ausgeschlossen. Dagegen bestand eine doppelseitige Recurrenslähmung, wodurch die beiden Stimmbänder in dauernder Abduktionsstellung standen. Auch hier konnte

der Röntgenbrei anstandslos durch den insuffizienten Kehldeckelverfluß durch die Trachea in den Bronchialbaum gelangen, nachdem der oberhalb der Stenose erweiterte Oesophagus gefüllt war. Auch der dritte Fall von kombinierter Recurrens- und Posticuslähmung, den Weingärtner beobachtete, soll hier erörtert werden. Es handelte sich um einen 60jährigen Mann, der wegen starker Heiserkeit und zunehmenden Schluckbeschwerden die Klinik aufsuchte. Die Laryngoskopie ergab eine vollständige Lähmung des rechten Stimmbandes und eine linksseitige Posticuslähmung. Die Röntgendurchleuchtung deckte eine beträchtliche Stenose etwas unterhalb der Kehlkopfgegend auf, von wo aus der Bariumbrei sich nach oben hin anstaute und sich durch den Kehldeckel in die Trachea ergoß. Die Autopsie bestätigte den klinischen Befund. Es bestand ein ca. 10 cm langes, zwischen Ringknorpel und Gabelung gelegenes Oesophaguskarzinom, in das die Nervi laryngei inferiores eingebettet waren, wodurch die Recurrenslähmung erklärt war. Hingegen fand sich keine Perforation zwischen Oesophagus und Trachea.

Am 10. 4. 1917 berichtete Reiche im Ärztlichen Verein in Hamburg über nachfolgende postdiphtherische Lähmung bei einem 60jährigen Mann, der vor ca. 4 Wochen eine Halsentzündung durchgemacht hatte, die ärztlich nicht behandelt worden war. Er hatte in dieser Zeit ca. 40 Pfund an Gewicht abgenommen. Die Röntgendurchleuchtung schloß eine Perforation zwischen Oesophagus und Trachea aus. Unter entsprechender Therapie, insbesondere Strychnininjektionen konnte der Kranke geheilt werden.

Mühlmann beschrieb 1918 bei einem 62jährigen Heimarbeiter ein hochsitzendes Oesophaguskarzinom, das dicht unterhalb des Kehlkopfes eine Stenose ausgelöst hatte. Auch hier lief der Röntgenbrei, nachdem er sich anfänglich an der Stenose gestaut hatte, in den Kehldeckel über, von wo aus er sich durch die Trachea in den Bronchialbaum ergoß. Eine Perforation konnte mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Zusammenfassung.

Es wurde versucht, die Perforation zwischen Oesophagus und Trachea an Hand der mir zur Verfügung stehenden Literatur in 92 einschlägigen Krankheitsfällen zu behandeln. Der Oesophagus ist von der Perforation wesentlich häufiger betroffen als die Trachea. Ich fand in 92 beschriebenen Krankheitsfällen 66, bei denen die Perforation primär von der Speiseröhre und 26, bei denen dieselbe primär von der Luftröhre ausging. Bei der ersten Hauptgruppe wurde die Perforation in 50% durch zerfallene Geschwülste von Karzinom, Lues, Tuberkulose und Aktinomykose ausgelöst. 14 Perforationen vom Oesophagus nach der Trachea waren durch Fremdkörper, Traktionsdivertikel, Verätzung und perioesophagealen Abzess bedingt. In 19 Fällen entstand die Perforation durch Entwicklungsmißbildung und zwar 9 mal bei Atresie des oberen Speiseröhrenabschnittes und 10 mal bei sonst normalem Oesophagus.

Bei den 26 Trachealperforationen nach dem Oesophagus hin war in 19 Krankheitsfällen die auslösende Ursache in Verletzungen zu suchen. In 4 Fällen war die Perforation durch Entwicklungsmißbildung bei sonst normalem Oesophagus entstanden. In 3 Fällen war die Entstehungsursache auf Lues und Karzinom zurückzuführen.

In den beobachteten Krankheitsfällen starben die meisten Kranken an den Folgen einer Pneumonie bzw. Lungengangraen, darunter einige anschließend an die Röntgendurchleuchtung. Daher ist bei der Röntgendurchleuchtung im Interesse des Kranken größte Vorsicht geboten und durch eine gut erhobene Anamnese vor wahllosem Breischlucken zu warnen. Einige Kranke wurden durch chirurgische bzw. konservative Behandlung gebessert bzw. geheilt.

In meinem Fall war die Oesophagotrachealperforation durch ein zerfallenes Gumma der Speiseröhre bei gleichzeitiger Tabes dorsalis entstanden. Auf Grund einer gut erhobenen Anamnese und unter größter Vorsicht überstand der Kranke die Röntgenuntersuchung anstandslos. Unter entsprechender spezifischer Behandlung schloß sich die Perforation, während die Tabes dorsalis nicht wesentlich beeinflusst wurde.

Auf die Differentialdiagnose wurde an Hand von 5 einwandfreien Beobachtungen hingewiesen. Hier bestand in 4 beschriebenen Krankheitsfällen eine Rekurrenslähmung mit Insuffizienz des Kehlkopfs durch ein stenosierendes Oesophaguskarzinom, wo eine Perforation vorgetäuscht wurde. In einem Fall war die Insuffizienz des Kehlkopfs durch postdiphtherische Lähmung bedingt. Letztere wurde unter entsprechender Behandlung geheilt.

Literaturverzeichnis.

- Aufrecht: Über Krankheiten des Oesophagus. Berlin. klin. Wöchr. Bd. 6, Heft 29, 1869.
- Bayer: Röntgenprax. Bd. 6, S. 31—34, 1934.
- Berger: Perforation der Speiseröhre und Röntgendurchleuchtung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 28, S. 533, 1921/22.
- Blumberger: Oesophago-tracheale Fisteln und ihre Aetiologie. Röntgenprax. Bd. 7, Heft 4, S. 241—245, 1925.
- Brenner: Ein Fall von Oesophagus-Trachealfistel und Stenose des Oesophagus. Beitrag z. Chir. (Billroths Festschrift) S. 206, 1892.
- v. Bruns, v. Hofmeister, v. Löwen: Hdb. d. prakt. Chir. Bd. 2, S. 155, 205, 210, 229, 270, 1930.
- Dolbeau: Leçons de clinique chir. Bd. 137, S. 132.
- Erkes: Über Schußverletzungen der Luft- und Speisewege am Hals. Zentralbl. f. Chir. Bd. 45 (1. Teil), S. 370—372, 1918.
- Eulenburg: Oesophaguserkrankungen. Real-Encyclopädi. d. ges. Heilk. Bd. 10, S. 943—945, 1911.
- Farland: Gangrene of the lung and death; carcinoma of the oesophagus with perforation of the right bronchus. Proceed of the pathol. Soc. of Philad. Bd. 2, S. 66, 1899.
- Gairdner: Edinburgh med. and surg. journal Bd. 16, S. 353.
- Gangolphe: Semaine médicale 1898.
- Garel: Revue Hebdom. de laryng. 1896.
- Gerhardt: Charité-Analen Bd. 15.
- Gerster: Med. Journal New-York S. 141, 1892.
- Giffhorn: Beitrag zur Aetiologie der kongenitalen Atresie des Oeso-

- phagus mit Oesophagotrachealfistel. Virchows Archiv f. pathol. Anatom. u. Physiol. Bd. 192, S. 112—126, 1908.
- Guattani: Mém. de l'Acad. Roy. de Chir. Bd. 2, S. 317.
- Györgyi: Oesophageobronchiale Fistel. Röntgenprax. Bd. 4, S. 590 bis 592, 1932.
- Hartung: Krebshafte Durchlöcherung der Speise- und Luftröhre des Dr. Krimer nebst Bemerkungen über diese Krankheit. Hufeland's Journ. S. 6, 1838.
- Hawes: Amer. J. med. Sci. Bd. 161, S. 791, 1921.
- Henfchen: Upsala Laek. Foer. Foerk. Bd. 10, S. 152. Ref. Chir. Zentralbl. Bd. 2, 1876.
- Hofer: Die tertiären Formen der Tracheallues. Hbd. d. Hals-, Nasen-, Ohrenheilk. Bd. 4, S. 316, 1928.
- Hoffmann: Atresia oesophagi congenita et communicatio inter oesophagum et tracheam. Inaug. Diss. Greifswald, 1899.
- Königstein: Oesophagotracheale Fistel und Recurrenslähmung infolge eines Fremdkörpers im Oesophagus. Moschr. f. Ohrenheilk. Bd. 47, S. 522—524, 1913.
- Kraßnig: Luetische Tracheoesophagustisteln. Wien. klin. Wschr. Bd. 33, Heft 6, S. 130—131, 1920.
- Kraus: Nothnagel spez. Pathol. u. Therap. Bd. 16 (Teil 1), S. 174, 223, 246, 1902.
- Kreuter: Zur Aetiologie der kongenitalen Atresien des Darmes und Oesophagus. Arch. f. klin. Chir. Bd. 88, 1909.
- Lamb: Philad. med. Times Bd. 3, S. 93, 1873.
- Lewen: Blinde Endigung des Halsteiles der Speiseröhre und direkte Fortsetzung ihrer Pars thoracica in die Luftröhre. Virchows Arch. f. path. Anatom. u. Phys. Bd. 114, S. 553—556, 1888.
- Lippich: Polypengefwür der Speiseröhre mit Durchbohrung der Luftröhre. Schmidt's Jahrb. d. Med. Bd. 30, S. 63—64, 1841.
- Lohnes: Zentralorg. f. d. ges. Chir. Bd. 27, S. 367, 1923.
- Lotheißen: Hdb. d. prakt. Chir. Bd. 2, S. 517, 519, 532, 561, 582, 665—666, 1930.
- Malkhassian: Thèse de Nancy. 1902.
- Marfchik: Verletzungen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. Hdb. d. Hals-, Nasen-, Ohrenheilk. Bd. 3, S. 769, 1928.
- Meili: Frankfurt. Zeitschr. f. Pathol. Bd. 31, 1925.
- Mekus: Eine seltene Mißbildung. Zentralbl. f. Gynaekol. Bd. 12, Heft 42, 1888.
- v. Navratil: Über die Heilung der Oesophago-Trachealfisteln. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 75, S. 467—502, 1904.
- Pickert: Arch. klin. Chir. Bd. 115, Heft 3, S. 744, 1921.

- Pieniazek: Die Verengerung der Luftwege. S. 973—974, 1901.
- Poncet u. Berard: Bull. Acad. de Méd. 1896.
- Reiche: Ärztl. Ver. Sitz. v. 10. 4. 1917. Münch. med. Wöchr. Bd. 64 (1. Teil), S. 622, 1917.
- Rohde: Perforationen der Speiseröhre. Hdb. f. Hals-, Nasen-, Ohrenheilk. Bd. 9, S. 415—417, 1929.
- Schmilinsky: Zit. n. Wessely. Hdb. f. Nasen-, Hals-, Ohrenheilk. Bd. 9, S. 167, 1929.
- Schmitz: Virch. Arch. Bd. 247, 1923.
- Schousboe: Corpus alienum oesophagi cum fistula oesophago-tracheale. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 68, S. 24—28, 1913.
- Schüller: Zur Lehre von der gleichzeitigen Verletzung der Luftröhre und Speiseröhre. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 7, S. 295—357, 1877.
- Sirot: Thèse de Lyon 1899.
- Smoler: Stich- und Schnittverletzungen der Speiseröhre. Prag. med. Wöchr. S. 365, 1908.
- Stübler: Angeborene Kommunikation zwischen Oesophagus und Trachea ohne Atresie des Oesophagus. Virchows Arch. Bd. 229, S. 382 bis 387, 1921.
- Teschendorf: Oesophaguskarzinom mit Perforation in die Luftwege. Deutsch. med. Wöchr. Hft 45, 1920.
- Trioen: Ref. n. Boyer. Traité des maladies chirurgicales et des opérations, qui leur conviennent. Bd. 7, S. 32, 1821.
- Vigla: Ausgebreitete Verschwärung und Perforation der Speiseröhre, Kommunikation zwischen dieser und der Luftröhre. Schmidt's Jahrb. d. Med. Bd. 88, S. 46—48, 1855.
- Vinson u. Sutherland: Zit. n. Bayer. Röntgenprax. Bd. 6, S. 31, 1934.
- Weingärtner: Wismut im Bronchialbaum bei Oesophaguskarzinom ohne Perforation nach den Luftwegen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 22, S. 397—399, 1914/15.
- Wessely: Krankheiten der Speiseröhre. Hdb. d. Hals-, Nasen-, Ohrenheilk. Bd. 9, S. 125, 162, 166—167, 1929.
- Widmann: Über angeborene und über krebfige Speiseröhren-Luft-röhrenfistel. Virchows Arch. Bd. 233, S. 185—190, 1921.
- Ziegler: Kontrastbrei im Bronchialbaum. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. 27, Heft 3, 1920/21.
-

Lebenslauf.

Am 7. Juli 1904 wurde ich, Hans Braun, als Sohn des Schreinermeisters Wilhelm Braun und seiner Ehefrau Anna Margaretha, geb. Milde, in Friesheim geboren.

Ich besuchte fünf Jahre die Volksschule in Friesheim, fünf Jahre die Höhere Knabenschule in Lechenich und vier Jahre das Städtische Gymnasium in Rheinbach, wo ich am 5. März 1924 die Reifeprüfung bestand. Danach studierte ich in Bonn Chemie, vom Sommersemester 1925 ab Medizin, bestand am 11. November 1926 die ärztliche Vorprüfung und am 3. Juli 1930 das ärztliche Staatsexamen mit „gut“. Vom Juli 1930 bis Oktober 1931 war ich als Medizinalpraktikant und Assistenzarzt am Städtischen Krankenhaus in Elbing tätig. Am 15. Juli 1931 wurde ich approbiert. Vom 1. Oktober 1931 bis 1. Juni 1934 war ich Assistenzarzt an der Inneren Abteilung des St. Bernwards-Krankenhauses in Hildesheim. Vom Juni 1934 an habe ich laufend praktische Ärzte vertreten.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Graff für die bereitwillige Überlassung der Arbeit und seine gütige Unterstützung dabei herzlichst zu danken.
